



VARIČELA OVČIJE BOGINJE

mogu biti ozbiljna bolest...^{1,2}

Informacije
o bolesti
za roditelje



Šta izaziva ovčije boginje?

Ovčije boginje izaziva virus,
varičela zoster virus.^{1,2}

Koji su simptomi ovčijih boginja?

Najčešći simptomi **ovčijih boginja** su **svrab i osip u obliku plika, povišena temperatura, umor, glavobolja i gubitak apetita**. Svrab se obično javlja na koži glave i tela, i potom se širi na lice, ruke i noge. Bolest traje oko **5-10 dana**.^{1,2}



svrab



povišena temperatura



glavobolja

Kako se ovčije boginje prenose?

Ovčije boginje se prenose

- **kašljanjem** ili **kijanjem** (prenos vazduhom) ^{1,2}
- direktnim kontaktom tečnosti iz: ^{1,2}
 - plika osobe koja je inficirana **ovčijim boginjama** ^{1,2}
 - **promene na koži** osobe koja ima herpes zoster. ^{1,2}



Koliko vremena je potrebno da moja beba/dete dobije simptome koji potvrđuju da ima ovčije boginje nakon izloženosti virusu?

- Potrebno je od **10 do 21 dan** za bebe/decu da razviju simptome nakon što su bili izloženi osobi koja je inficirana ovčijim boginjama. ^{1,2}
- Dodatno, osoba sa **ovčijim boginjama** može da prenosi bolest **od 1 do 2 dana** pre nego što dobije osip i dok se **ovčije boginje** razviju u kraste. ¹

● ● ● Koliko su ozbiljne ovčije boginje za moju bebu/dete?

● Većina dece koja ima ovčije boginje se kompletno oporavi za nedelju dana. Međutim, svrab može biti veoma neprijatan.^{1,2}

● Deca sa ovčijim boginjama izostaju po nekoliko dana iz škole ili vrtića.^{1,2}

Ova bolest takođe može izazvati ozbiljne probleme kao što su:

● Bakterijska infekcija kože koja može da dovede do stvaranja ožiljaka^{1,2}

● Dehidracija^{1,2}
(gubitak telesne tečnosti)

● Pneumonija^{1,2}
(upala pluća)

● Encefalitis^{1,2}
(upala mozga)

Pojedinoj deci može biti potrebno bolničko lečenje.
Ovčije boginje mogu biti čak i smrtonosne.²



Komplikacije su
češće kod **dece**
sa slabijim
imunim sistemom.¹



● ● ● Šta je vakcina protiv ovčijih boginja?

Vakcina protiv **ovčijih boginja** štiti od **ovčijih boginja**. Napravljena je od oslabljenog virusa varičele koji štiti decu tako što priprema njihov organizam da se bori protiv virusa.²

Zašto bi trebalo da vakcinišem dete protiv ovčijih boginja?

Vakcina protiv **ovčijih boginja** štiti od neprijatne i ponekad ozbiljne bolesti.²

Da li se vakcine protiv ovčijih boginja dobro podnose?

Vakcine protiv ovčijih boginja se uglavnom dobro podnose. Vakcine, kao i ostali lekovi, mogu imati neželjene reakcije. Moguće neželjene reakcije su obično blage. Uobičajene neželjene reakcije mogu biti osetljivost na mestu uboda, temperatura i blagi osip. Ozbiljne neželjene reakcije su generalno veoma retke.²



**Ovčije boginje
su bolest koja
se može sprečiti.**

**Šta mogu da uradim da zaštitim
svoje dete od ovčijih boginja ukoliko
ono nije vakcinisano?**

- Izbegavajte kontakt Vašeg deteta sa osobama koje su inficirane ovčijim boginjama.¹
- Razgovarajte već danas sa Vašim lekarom da li je vakcinacija odgovarajuća za Vaše dete.



Razgovarajte već danas sa Vašim lekarom o zaštiti od ovčijih boginja.

Reference:

1. Chickenpox (Varicella): Questions and Answers - Information about the disease and vaccines. Immunization Action Coalition, St. Paul, Minnesota; Item #P4202 (7/13). www.immunize.org/catg.d/p4202.pdf
2. Diseases and the vaccines that prevent them - Information for parents. (Last updated February 2013). Centers for Disease Control and Prevention, CS 230405M. <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/varicella/downloads/PL-dis-chickenpox-bw-office.pdf>

NP-RS-VAR-LBND-190001, maj 2019.



GlaxoSmithKline Export Ltd Predstavništvo, Beograd
Omladinskih brigada 88 11 070 Novi Beograd
Tel. (381 11) 31 05 700 Fax. (381 11) 31 05 799

Informacije
o bolesti
za roditelje

A white silhouette of a chicken's head, facing left, with a large question mark shape integrated into its profile. The question mark's stem is the chicken's neck, and the dot is a small circle on the chicken's forehead.