

Udruženje građana Roditelj



Kalendar imunizacije

OBAVEZNE VAKCINE



Na rodjenju

BCG
HB (1.)

Porodilište

Sa navršenih mesec dana

HB (2.)
HBIG *

Dom zdravlja

Sa navršenih dva meseca

DTaP (1.)
IPV (1.)
Hib (1.)
PCV (1.)

Dom zdravlja

Sa navršenih tri i po meseca

DTaP (2.)
IPV (2.)
Hib (2.)
PCV (2)

Dom zdravlja

U šestom mesecu

DTaP (3.)
IPV (3.)
Hib (3.)
PCV (3.)

Dom zdravlja

Sa navršenih šest meseci

HB (3.)

Dom zdravlja

Sa navršenih 13 meseci

MMR (1.)

Dom zdravlja

Sa navršenih 16 meseci

DTaP (rev)
IPV (rev)
Hib (rev)
PCV (rev)

Dom zdravlja

Pred polazak u školu

DTap (2.rev)
IPV (2.rev)
MMR (rev)


Dom zdravlja

U završnom razredu osnovne škole

dT (3. rev)
IPV (3.rev)


Dom zdravlja

*imunoglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg + majki



BCG

vakcina protiv tuberkuloze



HB

vakcina protiv hepatitisa B



DTP, TdaP (DT), TdaP (tD)

vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja



IPV(bOPV)

vakcina protiv dečje paralize (poliomijelitisa)



HiB

vakcina protiv oboljenja izazavanih
Hemofilusom influence tipa b



PCV

vakcina protiv pneumokoka



MMR

vakcina protiv malih beginja, zauški i rubeole

BCG -vakcina protiv tuberkuloze

Aktivna imunizacija protiv tuberkuloze se sprovodi sa BCG vakcinom kod dece u prvoj godini života sa ciljem da se spreče određeni teži klinički oblici tuberkuloze (tuberkulozni meningitis, diseminovani oblici tuberkuloze).

Deca se vakcinišu prilikom otpuštanja iz porodilišta, a ona rođena van porodilišta do navršena dva meseca života u teritorijalno nadležnom domu zdravlja.



HB - vakcina protiv akutnog hepatitisa B

Ona štiti dete od zarazne žutice tipa B. Vakcina se daje u tri doze. Beba prvu dozu dobija još u porodilištu ili sa napunjenih mesec dana, drugu kad beba napuni 2 meseca i to kao pojedinačnu vakcinu ili u obliku kombinovane šestovalentne vakcine, a treću sa 6 meseci, takođe kao pojedinačnu ili u obliku kombinovane šestovalentne vakcine.





DTAP/IPV/HIB I PNEUMOKOKNA VAKCINA

Kada vaše dete napuni dva meseca, tri i po i pet meseci života, prima kombinovanu petovalentnu vakcinu (IPV DTaP Hib) koja ga štiti od pet različitih bolesti: dečije paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja i oboljenja izazvanih Hemofilusom influence tipa B, a prema novom Pravilniku, i vakcini protiv pneumokokne bolesti.

Godinu dana posle treće doze kombinovane vakcine sprovodi se prva revakcinacija i vaše dete dobija četvrту dozu navedenih vakcina.



MMR – Vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole

Primarna vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i rubeole sprovodi se kod dece od navršenih 12 meseci jednom dozom kombinovane žive vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubeole – MMR vakcina (M-M-R-VaxPRO) i treba je sprovesti pravovremeno do navršenih 15 meseci života.

Revakcinacija (druga doza) protiv malih boginja, zaušaka i rubele sprovodi se primenom MMR vakcine (M-M-R-VaxPRO) pre upisa u prvi razred osnovne škole, a izuzetno u toku prvog razreda osnovne škole.

Važno

Vakcinacija je u najboljem interesu zdravlja vašeg deteta!

Zbog toga je ona obavezni deo preventivne zdravstvene zaštite dece.

Imajući u vidu da se redovnom vakcinacijom predupređuje nastanak epidemija i tako dugoročno štiti zdravlje celokupne zajednice, vakcinacija protiv određenih zaraznih bolesti je i **zakonom obavezna!**